

Effets indésirables potentiellement graves du Baclofène si les mesures adéquates de surveillance ne sont pas prises

<i>Risques</i>	<i>Précautions à prendre</i>
Attaques de sommeil : risque d'accidents	Exclure les activités à risque d'accident
Sédation Hypotonie musculaire (risque de chutes), dépression respiratoire	Attention si activités monotones (conduite automobile interdite les premiers temps du traitement) Attention avec les médicaments sédatifs et avec les médicaments diminuant le tonus (BZD, NL, AD,... Attention au risque de chute
Aggravation Syndrome d'Apnées du Sommeil (SAS) <u>et des risques CV liés au SAS</u>	Questionnaire de Berlin systématique, enregistrement du sommeil si suspicion
Hypotension artérielle : <u>risque d'hypoperfusion (Infarctus du myocarde, AVC chez sujets âgés,...)</u>	Surveiller la TA, diminuer le tt anti-HTA , faire un ECG ; exclure les patients âgés ou à risque CV
Déstabilisation de l'humeur (le Baclofène induit des dépressions (modérées) dans 10-15% des cas), peut induire des états hypomaniaques ou maniaques ; Risque de SUICIDE	Patients bipolaires : év. augmentation du TT Patients déprimés : év. augmentation du TT Prévenir le patient et l'entourage ; Surveiller, rester en lien étroit
Abaissement du seuil épileptogène : risque de crise d'épilepsie	Augmenter TT anti-comitial le cas échéant Patient qui a eu une crise liée au sevrage alcoolique : donner év. Dépakine ou Tégrétol Attention l'association avec médicaments antidépresseurs,...
Inhibe la libération de Dopamine	Attention en cas de maladie de Parkinson
Éliminé par le rein	Vérifier la fonction rénale ; adapter les doses
Semble stimuler les sécrétions acides de l'estomac	Eviter l'association avec des AINS, diphosphonates, ... év. Augmenter TT gastroprotecteurs
Grossesse	« Le Baclofène n'est pas tératogène chez l'animal ». Une étude (criticable) évoque une certaine tératogénicité chez l'être humain. « Dans le cadre de la prise en charge de la dépendance alcoolique, toutes les mesures permettant d'éviter une prise d'alcool en cours de grossesse sont préférables à la poursuite (ou à la reprise) de l'alcoolisation maternelle. »(LeCrat.org) Préférable aux 6000 enfants malformés nés de mère alcoolique en France chaque année. Mais éviter la grossesse : CONTRACEPTION Attention au sd de sevrage chez le nouveau-né
	Surveillance en cas d'insuffisance hépatique
Aggrave les troubles sphinctériens	Surveiller, év ; év. Oxybutynine (Ditropan) (anticholinergique)
Risque de Sd de sevrage à l'arrêt	Ne pas arrêter brutalement le traitement