

ZYBAN (BUPROPION) versus RITALINE (MÉTHYLPHÉNIDATE) PRINCIPAUX EFFETS SECONDAIRES

	ZYBAN	RITALINE LP
Épisode maniaque	Très rare	Rare
Épisodes psychotiques	Très rare	Peu fréquent
TOC		0 Rare
Dépression (surtout avant 25 ans)	Fréquent	Très rare
Insomnie	Très fréquent	Très fréquent
Nervosité, stress,	Fréquent	Fréquent
Attaques de panique	Indéterminé	Fréquent
Hypertension artérielle	Peu fréquent	Fréquent
Palpitations	Rares	Fréquent
Tachycardie	Très rare	Fréquent
Arythmie	En cas de surdosage	Fréquent
Troubles cérébrovasculaires		0 Fréquence indéterminée
Céphalées	Fréquent	Très fréquent
Convulsions	Rares	Très rares
Diminution de l'appétit	Peu fréquent	Très fréquent
Apparition ou aggravation de tics		0 Peu fréquent
Glaucome à angle ouvert et à angle fermé		0 Mydriase, augmentation pression : fréquence indéterminée
Diminution de la libido		0 Fréquent
Priapisme		0
Toux, douleur pharyngo-laryngée, dyspnée		0 Fréquent
Abus	Très rare	

ZYBAN (BUPROPION) versus RITALINE (MÉTHYLPHÉNIDATE) PRINCIPAUX EFFETS SECONDAIRES

Interactions médicamenteuses	<p>Inhibe isoenzyme 2D6 du CYP 450</p> <p>Métabolisé en son métabolite actif principal, l'hydroxybupropion, principalement par l'iso-enzyme CYP2B6 du cytochrome P450</p> <p>Largement métabolisé => particulièrement sensible aux inducteurs et inhibiteurs enzymatiques</p> <p>Syndrome sérotoninergique en cas d'association à un IRS</p> <p>Un délai d'au moins 14 jours devra être respecté entre l'arrêt des IMAO non sélectifs et l'initiation d'un traitement par ZYBAN L.P. Pour les IMAO sélectifs, un délai de 24 heures suffit.</p>	<p>Habituellement, pas d'interactions. Cependant, des cas d'inhibition possible du métabolisme des anticoagulants coumariniques, des antiépileptiques (ex. phénobarbital, phénytoïne, primidone) et de certains antidépresseurs (antidépresseurs tricycliques et inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine) ont été rapportés avec le méthylphénidate.</p> <p>Diminue l'efficacité des anti-hypertenseurs.</p>
Prudence avec les médicaments dopaminergiques et l'alcool	Oui	Oui
Grossesse et allaitement	Éviter le ZYBAN	Pas recommandé

Bupropion :

- Moins de risques cardio-vasculaires
- Pas de risque cérébro-vasculaire
- Moins de risques psychiatriques (sauf dépression) mais risque de convulsions
- Pas de risques de TOC, TIC, Glaucome, Priapisme, troubles de la libido, toux, douleurs pharyngo-laryngée

Dans les deux cas, possibilité de réactions allergiques, troubles digestifs, troubles musculaires,...